

BC-347 - Lebka čikarí červeného
Objednací kód: **4007.BC347**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Množstevní jednotka

ks

Čikarí červený (*Tamiasciurus hudsonicus*) je jedním ze tří druhů borovicových veverek a je široce rozšířena po celém severoamerickém

kontinentu všude tam, kde je běžné chladné počasí a jehličnany, s výjimkou pobřeží Tichého oceánu, kde se vyskytuje její příbuzná veverka Douglas. Tohoto denního zástupce čeledi Sciuridae lze od ostatních stromových veverek odlišit svým teritoriálním chováním, menší velikostí, sytě červeno-rezavě zbarvenou srstí a huňatým ocasem, bílou spodní stranou a bílými očními kroužky. Jeho potrava se skládá především ze semen šišek jehličnatých stromů, i když bylo pozorováno, že požívá jinou stromovou vegetaci, houby, bobule a květiny a příležitostně hmyz, vejce nebo malá zvířata. Během chladných zimních měsíců se spoléhá na zásoby potravy. Zuby této veverky se řídí typickým vzorem hlodavců: dva horní a dva spodní řezáky (na hlodání), které neustále rostou, aby se neopotřebovaly, a lící zuby (pro broušení) oddělené značnou mezerou (diastema). Společný název „červená veverka“ se také používá pro červeně zbarvenou veverku v Eurasii, nicméně jejich rozsahy se nepřekrývají a jsou považovány za různé druhy.